



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Champagne-Ardenne

Bulletins Techniques des Stations d'Alertes Agricoles n° 470 du 10 mars 2000 - 1 page
D'après les observations du 10 mars 2000

Colza

Stade : Tige de 8 à 25 cm. Boutons accolés à boutons en cours de dégagement (D1).

Charançon de la tige

Les conditions météorologiques de ces derniers jours ont été très favorables à l'activité de cet insecte. Les températures attendues pour ces prochains jours maintiendront une forte activité du ravageur.

Tous les colzas sont actuellement aux stades de plus grande sensibilité au charançon de la tige du colza. Les premières pontes sont observées dans tous les secteurs où le vol du charançon est confirmé par le piégeage en cuvette jaune. Le risque de nouvelles pontes est donc important. Rappelons que ce charançon est certainement le ravageur le plus nuisible du printemps. En effet lorsqu'il y a ponte, la réaction du colza face à celle-ci se traduit par un éclatement de la tige très préjudiciable.

■ Une intervention insecticide est à réaliser dès réception de ce bulletin pour les parcelles non encore protégées. Dans les situations les plus tardives, l'intervention peut être différée en tout début de semaine prochaine. Tout insecticide est inutile après le stade tige 20 cm.

Meligèthes

Le vol s'intensifie dans les secteurs les plus précoces. Dans de rares cas, le seuil d'intervention de 1 méligèthe par bouton est atteint (ex: Bagnoux -51). Ailleurs, ce seuil n'est pas encore dépassé, mais nécessite une surveillance attentive.

■ Surveillez les insectes en les dénombrant sur au moins 50 inflorescences.

Ne pas traiter avant le dépassement du seuil de 1 méligèthe par inflorescence.

Maladies

Aucun cas notable de maladies foliaires n'est observé sur notre réseau d'observation.

■ Aucune intervention fongicide n'est actuellement justifiée.



Prochain bulletin prévu le 22 Mars.



DRAF
Service Régional de la
Protection des Végétaux
Centre de Recherches
Agronomiques
2, Esplanade Roland
Garros - BP 234
51686 REIMS Cedex 2
Tél : 03.26.77.36.40
Fax : 03.26.77.36.74
E-mail : pvregionca@
agriculture.gouv.fr

Imprimé à la station
D'Alertes Agricoles de
Champagne-Ardenne
Directrice gérante :
Anne-Marie
BERTRAND
Publication périodique
C.P.P.A.P n°529 AD
ISSN n°0996-9861

Tarifs Courrier 425F - Fax 455F

Critères distinctifs des charançons de la tige du colza et du chou

Ch. de la tige du chou

- Long de 2.5 mm à 3 mm,
- Extrémité des pattes rousse
- Corps gris clair et tache blanche sur le dos,
- Non nuisible sur colza



Ch. de la tige du colza

- Le plus gros : 2.6 à 4 mm,
- Extrémité des pattes noire
- Corps gris foncé,
- Nuisible sur colza



COLZA

Charançons de la tige du colza : intervention immédiate

Meligèthes : forte intensification d'activité

Maladies : toute intervention est inutile